

【レジメン名】 mFOLFOXIRI 療法

【病名】 治癒切除不能・進行再発の大腸癌

【投与量】

Day 1 に投与

イリノテカン 150mg/m<sup>2</sup> : 60 分かけて

オキサリプラチン 85 mg/m<sup>2</sup> : 120 分かけて※)

レボホリナートカルシウム 200 mg/m<sup>2</sup> : 120 分かけて※)

フルオロウラシル(持続静注) 2400 mg/m<sup>2</sup> : 46 時間持続投与

1 クールを 14 日間とする

※) 同時に投与

	Day 1	Day 2	………	Day 15
イリノテカン	↓			↓
オキサリプラチン	↓			↓
レボホリナートカルシウム	↓			↓
フルオロウラシル(持続静注)	→	→		→

★備考

- ・ オキサリプラチン投与時に発現する過敏症を軽減させる為、投与前に抗アレルギー剤（ジフェンヒドラミン等）の投与を施行
- ・ 高度催吐性リスク  
ホスネツピタントを適用  
デキサメタゾン 4 mg を Day 2 より 1 回 1 錠 1 日 2 回(朝・昼) 3 日間服用  
オランザピン 5 mg を Day1 より 1 回 1 錠 1 日 1 回(夕)4 日間服用