

【レジメン名】 トリフルリジン・チピラシル (TAS-102) +ベバシズマブ療法

【病名】 治癒切除不能・進行再発の大腸癌

【投与量】

Day 1、15 に投与

ベバシズマブ

5 mg/kg : 90 分かけて※)

Day 1~5、Day 8~12 に内服

トリフルリジン・チピラシル (TAS-102)

1 回 35 mg/m² : 1 日 2 回 朝・夕食後

1 クールを 28 日間とする

※) 忍容性を確認後に短縮可

BSA (m ²)	トリフルリジン相当量
<1.07	35 mg/回
1.07 ≤ ~ <1.23	40 mg/回
1.23 ≤ ~ <1.38	45 mg/回
1.38 ≤ ~ <1.53	50 mg/回
1.53 ≤ ~ <1.69	55 mg/回
1.69 ≤ ~ <1.84	60 mg/回
1.84 ≤ ~ <1.99	65 mg/回
1.99 ≤ ~ <2.15	70 mg/回
2.15 ≤	75 mg/回



★備考

- ・ベバシズマブによる蛋白尿が発現する可能性がある為、開始前及び投与期間中は定期的に尿蛋白の検査を施行。
- ・ベバシズマブによる高血圧が発現することがある為、投与開始前及び投与期間中は定期的に血圧の測定を施行。
- ・中等度催吐性リスク。