

【レジメン名】 トリフルリジン・チピラシル (TAS-102) +ベバシズマブ療法

【病名】 治癒切除不能・進行再発の大腸癌

【投与量】

Day 1、15 に投与

ベバシズマブ

5 mg/kg : 90 分かけて※)

Day 1~5、Day 8~12 に内服

トリフルリジン・チピラシル (TAS-102)

1 回 75 mg/m<sup>2</sup> : 1 日 2 回 朝・夕食後

1 クールを 28 日間とする

※) 忍容性を確認後に短縮可

| BSA(m <sup>2</sup> ) | トリフルリジン相当量 |
|----------------------|------------|
| < 1.07               | 35 mg/回    |
| 1.07 ≤ ~ < 1.23      | 40 mg/回    |
| 1.23 ≤ ~ < 1.38      | 45 mg/回    |
| 1.38 ≤ ~ < 1.53      | 50 mg/回    |
| 1.53 ≤ ~ < 1.69      | 55 mg/回    |
| 1.69 ≤ ~ < 1.84      | 60 mg/回    |
| 1.84 ≤ ~ < 1.99      | 65 mg/回    |
| 1.99 ≤ ~ < 2.15      | 70 mg/回    |
| 2.15 ≤               | 75 mg/回    |



★備考

- ・ベバシズマブによる蛋白尿が発現する可能性がある為、開始前及び投与期間中は定期的に尿蛋白の検査を施行
- ・ベバシズマブによる高血圧が発現することがある為、投与開始前及び投与期間中は定期的に血圧の測定を施行
- ・中等度催吐性リスク