

【レジメン名】 CBDCA+PEM+ベバシズマブ療法

【病名】 治癒切除不能・進行再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮）

【投与量】

Day 1 に投与

|         |                                 |
|---------|---------------------------------|
| カルボプラチン | AUC 5～6 : 60 分かけて               |
| ペメトレキセド | 500 mg/m <sup>2</sup> : 10 分かけて |
| ベバシズマブ  | 15 mg/kg : 90 分かけて※)            |

1 クールを 21 日間とする

※) 忍容性を確認後に短縮可

|         | Day 1 | ………… | Day 22 |
|---------|-------|------|--------|
| カルボプラチン | ↓     |      | ↓      |
| ペメトレキセド | ↓     |      | ↓      |
| ベバシズマブ  | ↓     |      | ↓      |

★備考

- ・ 4クール施行しそれ以降はペメトレキセド、ベバシズマブのみ Maintenance を継続
- ・ ペメトレキセドによる重篤な副作用の発現を軽減する為、葉酸（経口）及びビタミン B12（注射）の投与を施行
- ・ ベバシズマブによる蛋白尿が発現する可能性がある為、開始前及び投与期間中は定期的に尿蛋白の検査を施行
- ・ ベバシズマブによる高血圧が発現することがある為、投与開始前及び投与期間中は定期的に血圧の測定を施行
- ・ 中等度催吐性リスク