

【レジメン名】 CDDP+PEM+ベバシズマブ療法

【病名】 治癒切除不能・進行再発の非小細胞肺癌（非扁平上皮）

【投与量】

Day 1 に投与

シスプラチン                    75 mg/m<sup>2</sup> : 120 分かけて  
ペメトレキセド                500 mg/m<sup>2</sup> : 10 分かけて  
ベバシズマブ                    15 mg/kg : 90 分かけて※)

1 クールを 21 日間とする

※) 忍容性を確認後に短縮可

	Day 1	…………	Day 22
ペメトレキセド	↓		↓
シスプラチン	↓		↓
ベバシズマブ	↓		↓

★備考

- ・4クール施行しそれ以降はペメトレキセド、ベバシズマブのみ Maintenance を継続
- ・ペメトレキセドによる重篤な副作用の発現を軽減する為、葉酸（経口）及びビタミン B12（注射）を投与する
- ・ベバシズマブによる蛋白尿が発現する可能性がある為、開始前及び投与期間中は定期的に尿蛋白の検査を施行
- ・ベバシズマブによる高血圧が発現することがある為、投与開始前及び投与期間中は定期的に血圧の測定を施行
- ・原則入院にて治療を施行
- ・高度催吐性リスク  
アプレピタントカプセル適用  
Day 1 : 抗がん剤投与 60~90 分前に 125 mg 服用  
Day 2・3 日目 : 午前中に 80 mg 服用  
デキサメタゾン 4 mg を Day 2 より 1 回 1 錠 1 日 2 回(朝・昼) 3 日間服用