

【レジメン名】 FP+RT 療法

【病名】 食道癌

【投与量】

Day 1 に投与

シスプラチン 70~75 mg/m² : 120 分かけて

Day 1~4 に投与

フルオロウラシル 700~1000 mg/m² : 24 時間かけて

1 クールを 28 日間とする

	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	……	Day 28
シスプラチン	↓					↓
フルオロウラシル	→	→	→	→		→

★備考

Stage	フルオロウラシル投与量	シスプラチン投与量	追加化学療法
I	700 mg/m ² 4 日間	70 mg/m ²	なし
II/III (T4 以外)	1000 mg/m ² 4 日間	75 mg/m ²	FP 療法 2 コース
III (T4)/IVa	700 mg/m ² 4 日間	70 mg/m ²	FP 療法 2 コース

- 放射線治療と併用し計 2 コース施行、放射線療法との併用療法終了後、Stage II 以上の場合は追加 FP 療法を 2 コース施行。
- 原則入院にて治療を施行。
- 高度催吐性リスクとして対応。
- ホスネツピタント使用。
- デキサメタゾン 4mg を Day2 より 1 回 1 錠 1 日 2 回(朝・昼)2-3 日間服用
- オランザピン 5 mg を Day1 より 1 回 1 錠 1 日 1 回(夕)4-6 日間服用。